

BVD : Dépister précocement les IPI

Version 1 du 15/03/2016

**NOUVEAU :
« BOUCLES
BVD »**

RAPPEL : QU'EST CE QU'UN IPI ?

Infecté : le fœtus a rencontré le virus dans le ventre de sa mère en début de gestation

Permanent : il porte et excrète le virus dès sa naissance et jusqu'à sa mort

Immunotolérant : il ne fabriquera jamais d'anticorps contre le virus de la BVD

Un objectif :

IDENTIFIER les IPI
le plus tôt possible
pour les **ELIMINER**

La BVD est une maladie contagieuse pouvant entraîner de lourdes pertes économiques.

Souvent sans symptôme visible, seuls les dépistages permettent de mettre en évidence le virus BVD.

Autant que possible, il est important de les réaliser précocement pour éviter d'élever un IPI qui sera voué à mourir jeune dans la majorité des cas.

D'après l'Observatoire de la BVD, les pertes sont estimées à :

- * de 10,70 à 19 € / 1000 L en élevage laitier
- * 58 € / vache en élevage allaitant

Différentes méthodes de prélèvement :

⇒ la prise de sang réalisée par le vétérinaire quel que soit l'âge de l'animal

⇒ la biopsie auriculaire (prélèvement de cartilage au niveau de l'oreille) réalisée par l'éleveur grâce à la pose de boucles « Ultra TST » sur les veaux dès la naissance


Notre conseil :

TOUS LES VEAUX DOIVENT ÊTRE DEPISTES !

Les boucles « Ultra TST » sont communément appelées « BOUCLES BVD » car elles permettent de prélever du cartilage en vue d'une analyse virologique BVD.

La même boucle remplit **deux fonctions :**

- **identifier** le bovin conformément à la réglementation
- **prélever** du cartilage en vue d'un dépistage virologique



Cette méthode est :

- ♦ **Simple** car le prélèvement est réalisé en même temps que l'identification du veau
- ♦ **Précoce** grâce à la pose des boucles dès la naissance
- ♦ **Fiable** tant en termes de résultats d'analyse que de traçabilité

Pose de la boucle « ULTRA TST »

Mise en place de la pièce mâle puis femelle




La boucle ULTRA TST est posée définitivement à l'oreille, elle est reconnaissable à sa tête blanche.



L'aiguille de prélèvement reste sur la pince.



Placer l'aiguille dans le tube et fermer.



Envoi des échantillons

Insérer l'aiguille et le tube dans le sachet.



Compléter les informations sur l'étiquette et la glisser dans le sachet



Glisser le sachet dans l'enveloppe fournie.



Coller l'étiquette du laboratoire sur l'enveloppe



Les échantillons sont envoyés par l'éleveur le jour même et individuellement au laboratoire.

Combien ça coûte ?

Boucles « ULTRA TST »	Tarif 2016 (HT)	Analyse sur biopsie auriculaire	Tarif 2016 (HT)
Pince	12 €	PCR	5 €
Surcoût boucle « ULTRA TST » <i>Ce surcoût est lié au dispositif de prélèvement ainsi qu'au matériel fourni pour l'envoi des échantillons au laboratoire (enveloppe pré-timbrée, ...) et aux frais de gestion.</i>	2,07 €	(individuelle ou de mélange) <i>Le tarif comprend les éventuelles reprises en individuel en cas de résultat positif.</i>	

Pour tous renseignements, contacter le service sanitaire du GDS :

GDS du Cantal
23 Bd Canteloube—BP 20629—15006 AURILLAC CEDEX
Tel : 04 71 63 33 00 - Fax : 04 71 63 33 30
Courriel : contact@gds15.org
Web : www.gds15.fr

